



Knowledge grows

YaraVita™ SENIPHOS



Folyékony foszfor, kalcium, és nitrogén tartalmú lombtrágya ültetvények kezelésére. Használatával javul a termés minősége, tárolhatósága, színeződése.

Összetétel:

- 310 g/l foszfor-pentoxid tömeg százalékban kifejezve: 23,6% P_2O_5 tartalom
- 56 g/l CaO, nem vízoldható kalcium tömeg százalékban kifejezve: 3% Ca tartalom
- 39 g/l nitrogén tömeg százalékban kifejezve 3% N tartalom

Szín: Átlátszó sárgás-zöld folyadék

Kémhatás: 1,1

Sűrűség: 1,312 kg/l

Kiszerezés: 10 liter, nettó tömeg: 13,12 kg

Fagyáspont: <-15°C



Kijuttatásával javíthatjuk a gyümölcshús fizikai paramétereit - így a gyümölcs hűskeménységét - ezzel jelentősen javítva a tárolhatóságot. Alkalmazása segít az optimális kalcium/foszfor arány kialakulásában. Használatával javul a termés minősége, tárolhatósága, és a színeződése.

A YaraVita™ Seniphos előnyei:

- Az egyedi formulázás és összetétel miatt biztonságos és hatékony felhasználás
- Optimális tartamhatás
- Ragasztó és felületi feszültséget csökkentő anyagot tartalmaz a hatékonyabb felhasználás érdekében.

Keverhetőség

A termék a legtöbb növényvédő szerrel keverhető, a változó körülmények miatt minden esetben végezzen keverési próbát. A termék keverhetőségéről a www.tankmix.com oldalon is tájékozódhat.

Felhasználási útmutató

Termés	Alkalmazás	Mennyiség l/ha
Alma	10 l/ha dózisban alkalmazzuk szíromlevél hullás után, 10-14 naponta ismételve. 3-8 kezelés javasolt. Permetlé mennyiség: 400 l/ha minimum. Színezésre: 10 liter/ha adagban, 500-1000 l/ha permetlé mennyiséggel kijuttatva. YaraVita™ Seniphoszt ebben az esetben tilos keverni növényvédő szerekkel, egyéb adalék anyagokkal, csak önmagában adható ki! 1-2 kezelés szükséges (7 nap kihagyással) amikor a színeződés megindul, ami általában 2-3 héttel a betakarítás előtt következik be.	
Burgonya	A kezdeti növekedés stimulálására: 10 l/ha dózisban alkalmazzuk kelés után. Gumó méretének növelésére, legálább 2 kezelés 5-10 l/ha adagban juttassuk ki (amikor az első gumók átmérője eléri a 10 mm-t), 10-14 naponként ismételve.	Permetlé: 300-600
Cseresznye	5 l/ha adagban, 2-5 alkalommal használjuk, 7-14 napos időközönként a szíromlevélhullástól.	Víz mennyiség: 400-1000
Körte	5 l/ha adagban, 3-6 alkalommal használjuk, 7-14 napos időközönként a szíromlevélhullástól.	Víz mennyiség: 400-1000
Őszi barack	10 l/ha dózisban alkalmazzuk szíromlevél hullás után, 7-14 naponta ismételve. 2-5 kezelés javasolt.	Permetlé: 500-1000
Sárgabarack	5 l/ha adagban, 2-5 alkalommal használjuk, 7-14 napos időközönként a szíromlevélhullástól.	Víz mennyiség: 400-1000
Szamóca (szántóföldi termesztés)	Nem folytonérő fajtáknál: 10 l/ha dózisban alkalmazzuk, a virágzástól kezdve, 7-10 naponként ismételve. 3 kezelés javasolt. Folyton érő fajtáknál, a tenyészidőszak alatt 5 l/ha dózisban alkalmazzuk, 10-14 naponta ismételve. 6 kezelés javasolt. A kezeléseket 10-14 naponként lehet megismételni.	Permetlé: 200-600
Szőlő	10 l/ha dózisban alkalmazzuk kötődéstől, 10-14 naponta ismételve. 2-4 kezelés javasolt.	Permetlé: 500-800

További információ:

Éri Ferenc kereskedelmi vezető, tel.: +36 30 2772 556, e-mail: ferenc.eri@yara.com

Gyuris Kálmán szaktanácsadó, Dél-Magyarország, tel.: +36 30 3839 341, e-mail: kalman.gyuris@yara.com

Tóth Milena szaktanácsadó, Dél-dunántúl, tel.: 30 883 0731, e-mail: milena.toth@yara.com

Dr. Termeg János, szaktanácsadó, Észak-Dunántúl, tel.: +36 30 3498 084, e-mail: janos.termeg@yara.com

Tóth Gábor szaktanácsadó, Észak-Magyarország, tel.: +36 30 6898 094, e-mail: gabor.toth@yara.com

Kovács András kertészeti szaktanácsadó, Kelet-Magyarország, tel.: +36 30 6898 095, e-mail: andras.kovacs@yara.com-

Szabari Szabolcs szaktanácsadó, Közép-Alföld, tel.: +36 30 964 9513 e-mail: szabolcs.szabari@yara.com

Ügyfélszolgálat: +36 88 577 944

Készült: 2017. január
www.yara.hu, www.yaravita.hu



A Yara Hungária Kft. odafigyel környezetére, ezért információs anyagait újrahasznosított papírra nyomtatja.

