



Knowledge grows

YaraVita™ STOPIIT

Folyékony kalcium tartalmú lombtrágya a kalciumhiány megelőzésére és gyógyítására.

Összetétel:

- 224 g/l vízoldható kalcium-oxid tömeg százalékban kifejezve: 16,9% CaO tartalom

Szín: Átlátszó zöld folyadék

Kémhatás: 9,8

Sűrűség: 1,327 kg/l

Kiszerezés: 10 liter, nettó tömeg: 13,27 kg

Fagyáspont: < -20°C



Kalciumhiányos paprika



Magas kalcium tartalmú folyékony lombtrágya. Alkalmazásával megelőzhető a kalcium hiánnyal összefüggő hiánybetegségek, például almánál a sztípikesedés. A Stopit élelmiszer minőségű kalcium-kloridot tartalmaz, mely garanciát jelent a minőségi végtermék előállításához. A kísérletek bebizonyították, hogy alkalmazása biztonságosabb és hatékonyabb más klorid alapú termékekénél.

AA YaraVita™ Stopit előnyei:

- Az egyedi formulázás miatt biztonságos és hatékony felhasználás
- Kedvező ár/érték arány
- Optimális tartamhatás
- Ragasztó és felületi feszültséget csökkentő anyagot tartalmaz a hatékonyabb felhasználás érdekében

Keverhetőség

A termék a legtöbb növényvédő szerrel keverhető, a változó körülmények miatt minden esetben végezzen keverési próbát. A termék keverhetőségéről a www.tankmix.com oldalon is tájékozódhat.

Felhasználási útmutató

Termés	Alkalmazás	Víz mennyiség l/ha
Alma ültetvény	10 l/ha dózisban alkalmazzuk, szíromhullástól a várható betakarítás előtti hétig 7-14 naponta ismételve.	400-1000
Burgonya	5-10 l/ha dózisban alkalmazzuk, gumóképződéstől (virágzás után) 10-14 naponta ismételve. 2-3 kezelés javasolt.	400-600
Cseresznye, meggy	10 l/ha dózisban alkalmazzuk a betakarítás előtti 2. és 4. héten. 2 kezelés javasolt.	400-800
Görögdinnye	5 l/ha dózisban alkalmazzuk, a kötődéstől kezdve 7 naponta ismételve. 2-3 kezelés javasolt.	Vízigény: 300-600
Körte	5-10 l/ha dózisban alkalmazzuk, 14 naponta ismételve. 2-3 kezelés javasolt. Az utolsó kezelés a betakarítás előtti egy héttel történjen.	400-1000
Szabadszőlő paprika	5 l/ha dózisban alkalmazzuk, virágzástól folyamatosan a második, harmadik terméskötődésig. maximum 4 kezelés javasolt.	Vízigény: 300-600
Szabadszőlő paradicsom	5 l/ha adaggal virágzástól folyamatosan a második-harmadik terméskötődésig, 7-14 naponként megismételve.	Vízigény: 300-600
Szamóca	<u>A nem folyamatosan érő fajták esetén:</u> 10 l/ha dózisban alkalmazzuk, a virágzás kezdetétől 7-10 naponta ismételve. 3 kezelés javasolt. <u>Folyton érő fajtáknál:</u> 5 l/ha dózisban alkalmazzuk, 10-14 naponta ismételve. 6 kezelés javasolt.	300-600
Szilva	5 l/ha dózisban alkalmazzuk, a virágzástól a második, harmadik terméskötődésig, 7-14 naponta ismételve.	Vízigény: 400-1000
Szőlő	7-10 l/ha dózisban alkalmazzuk, a terméskötődés után, 7-14 naponta ismételve. Maximum 4 kezelés javasolt.	Vízigény: 500-1000
Őszibarack	Szokásos alkalmazása 5-10 l/ha, 7-14 naponként a szírumlevél hullástól a betakarítás előtti hétig.	400-1000
Sárgabarack	Szokásos alkalmazása 5-10 l/ha, 7-14 naponként a szírumlevél hullástól a betakarítás előtti hétig.	400-1000
Dió	10 l/ha adagban, 2-5 alkalommal használjuk, 7-14 napos időközönként a szírumlevélhullástól.	400-1000

További információ:

Éri Ferenc kereskedelmi vezető, tel.: +36 30 2772 556, e-mail: ferenc.eri@yara.com

Gyuris Kálmán szaktanácsadó, Dél-Magyarország, tel.: +36 30 3839 341, e-mail: kalman.gyuris@yara.com

Tóth Milena szaktanácsadó, Dél-dunántúl, tel.: 30 883 0731, e-mail: milena.toth@yara.com

Dr. Térmeg János, szaktanácsadó, Észak-Dunántúl, tel.: +36 30 3498 084, e-mail: janos.termeg@yara.com

Tóth Gábor szaktanácsadó, Észak-Magyarország, tel.: +36 30 6898 094, e-mail: gabor.toth@yara.com

Kovács András kertészeti szaktanácsadó, Kelet-Magyarország, tel.: +36 30 6898 095, e-mail: andras.kovacs@yara.com-

Szabari Szabolcs szaktanácsadó, Közép-Alföld, tel.: +36 30 964 9513 e-mail: szabolcs.szabari@yara.com

Ügyfélszolgálat: +36 88 577 944

Készült: 2017. január
www.yara.hu, www.yaravita.hu



A Yara Hungária Kft. odafigyel környezetére, ezért információs anyagait újrahasznosított papírra nyomtatja.

