



Knowledge grows

YaraVita™ THIOTRAC 300

Folyékony, ként és nitrogént tartalmazó lombtrágya a kénhiány megelőzésére, kezelésére.

Összetétel:

- 750 g/l kén-trioxid
tömeg százalékban kifejezve 57% SO₃ tartalom
- 200 g/l nitrogén
tömeg százalékban kifejezve 15,2% N tartalom

Szín: Vörös színű folyadék

Kémhatás: 8-9

Sűrűség: 1,317 kg/l

Kiszerezés: 10 l, nettó tömeg: 13,17 kg

Fagyáspont: < 0°C



Kénhiányos repcelevél



A kiemelkedő kén- és nitrogéntartalma lehetővé teszi az elemek folyamatos adagolását lombon keresztül - főként a vegetatív fejlődés időszakában. Fontos a termék minőségére gyakorolt hatása káposztaféléknél, repcénél, kalászosoknál, és több más növény esetében is.

A YaraVita™ Thiotrac 300 előnyei:

- Az egyedi formulázás miatt biztonságos és hatékony felhasználás
- Kedvező ár/érték arány
- Optimális tartamhatás
- Ragasztó és felületi feszültséget csökkentő anyagot tartalmaz a hatékonyabb felhasználás érdekében

Keverhetőség

A termék a legtöbb növényvédő szerrel keverhető, a változó körülmények miatt minden esetben végezzen keverési próbát. A termék keverhetőségéről a www.tankmix.com oldalon is tájékozódhat.

Felhasználási útmutató

Termés	Alkalmazás	Vízmenyiség l/ha
Bab, borsó	5-10 l/ha dózisban alkalmazzuk a növény 4-6 leveles állapotában. Hiánytünetek jelentkezése esetén 10-14 nap múlva ismételjük meg a kezelést.	Szükséges: 300-600
Burgonya	5 l/ha dózisban alkalmazzuk egy héttel a teljes kelést követően, majd 5 l/ha dózisban a gumóképződés ideje alatt. Hiánytünetek jelentkezése esetén 10-14 nap múlva ismételjük meg a kezelést.	300-600
Cukorrépa	3 l/ha dózisban alkalmazzuk a növény 4-6 leveles állapotában. Hiánytünetek jelentkezése esetén 10-14 nap múlva ismételjük meg a kezelést.	300-600
Hagymafélék	5 l/ha dózisban alkalmazzuk mikor a növény eléri a 15 cm-es magasságot. Hiánytünetek jelentkezése esetén 10-14 nap múlva ismételjük meg a kezelést.	Szükséges: 300-600
Kalászosok	3-4 l/ha dózisban alkalmazzuk a szárbaindulás kezdetétől az első nódusz kialakulásáig. Hiánytünetek jelentkezése esetén 10-14 nap múlva ismételjük meg a kezelést. Minőségjavításra 3-5 l/ha adagban alkalmazzuk a fülecske teljes kifejlődésétől a szemek teljes érésének időszaka alatt vagy 2 l/ha dózisban kétszer juttassuk ki a zászlós levél rész fejlődésének látható jelétől a szemek teljes érési fázisának végéig.	200-400
Káposztafélék	5 l/ha dózisban alkalmazzuk a növény 4-6 leveles állapotában. Hiánytünetek jelentkezése esetén 10-14 nap múlva ismételjük meg a kezelést.	300-600
Napraforgó	5 l/ha adagban alkalmazzuk, 4-6 leveles állapotban.	200-400
Őszi káposztarepce	3-5 l/ha dózisban alkalmazzuk 4-6 leveles állapotban és szármegnyúlás kezdetén. Hiánytünetek jelentkezése esetén 10-14 nap múlva ismételjük meg a kezelést. Kerüljük a virágzás időszakát!	200-400
Sárgarépa, fehérrépa	5 l/ha dózisban alkalmazzuk, amikor a növény eléri a 15 cm-es magasságot. Hiánytünetek jelentkezése esetén 10-14 nap múlva ismételjük meg a kezelést.	300-500

További információ:

Éri Ferenc kereskedelmi vezető, tel.: +36 30 2772 556, e-mail: ferenc.eri@yara.com

Gyuris Kálmán szaktanácsadó, Dél-Magyarország, tel.: +36 30 3839 341, e-mail: kalman.gyuris@yara.com

Tóth Milena szaktanácsadó, Dél-dunántúl, tel.: 30 883 0731, e-mail: milena.toth@yara.com

Dr. Termeg János, szaktanácsadó, Észak-Dunántúl, tel.: +36 30 3498 084, e-mail: janos.termeg@yara.com

Tóth Gábor szaktanácsadó, Észak-Magyarország, tel.: +36 30 6898 094, e-mail: gabor.toth@yara.com

Kovács András kertészeti szaktanácsadó, Kelet-Magyarország, tel.: +36 30 6898 095, e-mail: andras.kovacs@yara.com-

Szabari Szabolcs szaktanácsadó, Közép-Alföld, tel.: +36 30 964 9513 e-mail: szabolcs.szabari@yara.com

Ügyfélszolgálat: +36 88 577 944

Készült: 2017. január
www.yara.hu, www.yaravita.hu



A Yara Hungária Kft. odafigyel környezetére, ezért információs anyagait újrahasznosított papírra nyomtatja.

